

**AGROEXPERT növényvédelmi előrejelzés****2011. 06.30.**

Múlt csütörtökön az esti zivatarral jégverés érte A Harka-Kogl-Kópháza sávban a borvidéket. Helyenként a termés fele-kétharmada is odalett. A többi területet csak minimális (vagy az sem) kár érte. A bogyók növekedése folyamatos, lassan-lassan „kinövik” a veszélyes fejlődési szakaszt. A jól kötött fürtök java a fürtzáródás előtti stádiumba ért. Talán a virágzás alatti száraz idő, vagy a túl kevés tavalyról áthozott tápanyag miatt elég sok bogyó nem kötött megfelelően, s ezek leperegnek a fűtről.

A 2. molynemzedék rajzásgörbéje alapján 27.-ére esett a rajzáscsúcs, erre 5-7 napra célszerű időzíteni a védekezést. Kevés moly repült, kivéve az erősen fertőzött Mélyút dűlőt. Itt nagyon figyelni kell a molykártétel megelőzésére!

Peronoszpóra-veszély a borvidék zömén továbbra is alacsony, és tovább csökken. Lehet ugyan találni elszórtan 1-2 olajfoltot a lombon, főleg a hónaljajtásokon, de igen ritka, ahol a spóráképződés végbemegy. Kivételt jelent Fertőszentmiklós, a Hard és a Kogel dűlő. Itt több az olajfolt – jelezve az áttelelt fertőzőanyag-mennyiséget, ráadásul a jégverés után sarjadó hónaljajtások friss levelei igen érzékenyek a fertőzésre – ezért ezekben a dűlőkben felszívódó (nem lokálszisztémikus!) hatóanyagokat javaslok. (Pergado, Forum, Melody) Másutt megfelelő védelmet biztosítanak az olcsóbb kontakt készítmények (rezek, Antracol, Folpan, Delan, Bravo, stb.).

A lisztharmat fertőzési nyomása továbbra is magas. Ennek ellenére nincs járványveszély, csak azon ültetvényekben találni nagyobb mértékű fertőzést, ahol áttelelt a gomba. Még kb. Két hétig folyamatosan védelmet kell biztosítanunk a bogyóknak, tartva a 10-12 napos permetezési fordulókat. Javasolom az új hatóanyagok közül a **Collis, Talendo, Vivando** használatát amit kiegészítünk 0,8-1%-os koncentrációjú (4 kg/hektár) kénnel (**Thiovit, Kumulus** stb.) Mivel a bogyóhéjon egyre romlik a hatóanyagok felszívódása, ezen szerek most hatásosabbak az azoloknál. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a megfelelő időben és minőségben elvégzett zöldmunkák nagyban meghatározzák a vegyszeres növényvédelem hatékonyságát! A legjobb, legdrágább szer sem ér semmit, ha nem borítja be a fürt felületét... Nem elég a törzstisztítás elvégzése, a hajtásválogatás, - rendezés, csonkázás, ablakozás nagyon fontos!

06.23.-06.30.	átlaghőmérséklet	csapadékösszeg
Harka	18,8 °C	38,4 mm
Kogel	18,6 °C	36,6 mm
Virágvölgy	18,5 °C	18,8 mm
Jánostelep	19,1 °C	23,4 mm
Kópháza	18,8 °C	31,2 mm
Présház	Állomáshiba miatt	Nincs adat
Újhegy	18,9 °C	25 mm
Balf	19,1 °C	44,6 mm
Fertőendréd	19,2 °C	20,8 mm
Fertőszentmiklós *	19,1 °C	25,6 mm

* Az Ethoffer Kft. meteorológiai állomásáról kapott adat

Dr. Varga Mária

Szaktanácsadó, 20/4709055

Hanyvári Péter

növényvédő mérnök, 30/4857510

Hollósy Attila

növényvédő mérnök, 30/2437795

BASF

Kumulus, Vivando, Collis a lisztharmat, Delan és Forum R a peronoszpóra, Cabrio Top mindkettő ellen.



Falcon a lisztharmat, Antracol és Melody a peronoszpóra, Eclair 49 WG mindkettő ellen.



Talendo a lisztharmat, Equation Contact és Tanos a peronoszpóra ellen.



Thiovit Jet és Topas a lisztharmat, Bravo és Pergado a peronoszpóra, Quadris Max a peronoszpóra és botritisz ellen.